

O microplancton do Atlântico nas imediações de Mar del Plata

pelos

Drs. ARISTIDES MARQUES DA CUNHA e O. DA FONSECA.

(Com 2 figuras no texto.)

O trabalho que ora publicamos é o resultado de pesquisas qualitativas feitas sobre material que fôra confiado a um de nós pelo Professor Dr. ANGEL GALLARDO, director do Museu Nacional de Historia Natural de Buenos Aires; ao ilustre naturalista argentino agradecemos a oportunidade que nos ofereceu de estudar assunto até agora ainda não pesquisado.

As diversas amostras de plancton foram colhidas a bordo do navio "PATRIA", á distância variável entre 5 e 10 milhas da costa nas águas fronteiras a Mar del Plata, mais ou menos a 38° de latitude Sul e 57° e 30' de longitude, a este de Greenwich. Parte desse material incluía apenas animais macroscópicos, copépodos, isopodos e chetognatas, cujo estudo não empreendemos; a maioria dele, entretanto, era constituída por microplancton em que, além de copépodos em fases diversas de desenvolvimento, de larvas *Pluteus* de *echinodermas* e de larvas de moluscos, encontravam-se fórmulas de diatomaceas, peridíneos, tintinnideos e silicoflagelados; só os representantes destes quatro últimos grupos fazem objeto do presente trabalho.

Conseguimos determinar 52 espécies, das quais uma apenas consideramos nova; dessa espécie unicamente, apresentaremos descrição e figura; a maioria das restantes já constituiu assunto de trabalho sobre o microplancton da baía do Rio de Janeiro, realizado, em colaboração com um de nós, pelo Dr. J. GOMES DE FARIA; sobre esses planctones já aqui assinalados nenhuma outra indicação se torna necessária, constituindo informação suficiente a lista que abaixo apresentamos.

I Zooplancton.


Tintinnodea.

1 - *Tintinnopsis beroidea* Stein, 1867.

2 - *Tintinnopsis platensis*, n. sp.

Descrição - Carapaça cilíndrica, estreitando-se bruscamente no inicio de seu terço posterior em que adquire perfil ojival; do vértice da ojiva parte um prolongamento caudal longo, afilado e mais ou menos acentuadamente curvo. Partículas esparsas de silício revestem os três quartos anteriores, correspondentes á parte cilíndrica e ojival da carapaça. A curvatura aparente do prolongamento caudal varia com a posição do animal,

ás vezes simulando ele ser completamente réto.



Dimensões — Comprimento total 250 μ ; comprimento do prolongamento caudal 60 μ ; largura da parte cilíndrica 45 μ .

Habitat — Atlântico Sul, imediações de Mar del Plata.

II. Phytoplankton.

Dinoflagellata.

- 3 — *Dinophysis homunculus* Stein, 1883.
- 4 — *Dinophysis ovum* Schuett, 1895.
- 5 — *Glenodinium trochoideum* Stein, 1883.
- 6 — *Diptopsis lenticula* Bergh, 1881.
- 7 — *Peridinium conicum* (Gran, 1900) Gran.
- 8 — *Peridinium depressum* Bailey, 1885.
- 9 — *Peridinium divergens* Ehrenberg, 1840.
- 10 — *Peridinium oceanicum* Vanhoeffen, 1897.
var. *oblongum* Aurivillius.
- 11 — *Peridinium obtusum* (Karsten, 1906) Fauré-Fremiet.
- 12 — *Peridinium pentagonum* (Gran, 1900) Gran.
- 13 — *Ceratium furca* (Ehrenberg, 1859).
- 14 — *Ceratium fusus* (Ehrenberg, 1833) Dujardin.
- 15 — *Ceratium tripos* (Mueller, 1781).

Bacillariophyta.

- 16 — *Paralia sulcata* (Ehrenberg, 1837).
- 17 — *Stephanopyxis appendicula* Ehrenberg, 1854.
- 18 — *Skeletonema costatum* (Greville, 1866).
- 19 — *Lauderia glacialis* Gruenow, 1884.
- 20 — *Leptocylindrus danicus* Cleve, 1889.
- 21 — *Guinardia flaccida* Castracane, 1886.
- 22 — *Coscinodiscus excentricus* Ehrenberg, 1839.
- 23 — *Coscinodiscus radiatus* Ehrenberg, 1839.
- 24 — *Actinophtychus splendens* (Ehrenberg, 1844).
- 25 — *Actinophtychus vulgaris* Schumann.
- 26 — *Rhizosolenia alata* Brightwell, 1858.
var. *genuma* Gran, 1911.
var. *indica* Peragallo, 1892.

- 27 — *Rhizosolenia calcar-avis* Schultze, 1858.
- 28 — *Rhizosolenia robusta* Normann, 1861.
- 29 — *Rhizosolenia schrubsolei* Cleve, 1881.
- 30 — *Rhizosolenia setigera* Brightwell, 1858.
- 31 — *Bacteriastrum furcatum* Schadb., 1854.
- 32 — *Chaetoceras contortum* Schuett, 1888.
- 33 — *Chaetoceras curvisetum* Cleve, 1889.
- 34 — *Chaetoceras didymum* Ehrenberg, 1845.
- 35 — *Chaetoceras holsaticum* Schuett, 1895.
- 36 — *Chaetoceras luciniosum* Schuett, 1894.
- 37 — *Chaetoceras pelagicum* Cleve, 1873.
- 38 — *Chaetoceras schuetti* Cleve, 1894.
- 39 — *Chaetoceras subtile* Cleve, 1896.
- 40 — *Chaetoceras weissflogii* Schuett, 1895.
- 41 — *Hemiaulus sinensis* Greville, 1865.
- 42 — *Ceratauliua bergenii* Peragallo, 1890.
- 43 — *Biddulphia favus* (Ehrenberg, 1839) v. Heurck.
- 44 — *Biddulphia mobiliensis* (Bailey, 1850) Gruenow.

- 45 - *Biddulphia rhombus* (Ehrenberg) W.
Smith, 1844.
- 46 - *Biddulphia sinensis* Greville, 1866.
- 47 - *Bellerochea malleus* (Brightwell, 1858).
- 48 - *Lithodesmium undulatum* Ehrenberg,
1840.
- 49 - *Ditylum brightwelli* (West, 1860).

- 50 - *Thallassiothrix nitzschiooides* Oruenow,
1862.
- 51 - *Asterionella japonica* Cleve, 1882.
- Silicoflagellata.
- 52 - *Dictyocha fibula* Ehrenberg, 1839.